Universidad Abierta Interamericana

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica

Trabajo Final de Carrera

Criterios actuales sobre la alergia al látex: impacto en la planta quirúrgica

Current criteria regarding latex allergy and its impact on surgical practice

Alumna: María Eugenia Risso Patrón

MariaEugenia.RissoPatron@alumnos.uai.edu.ar

Diciembre 2025

Resumen

Introducción: Este Trabajo Final Integrador aborda la alergia al látex en el ámbito quirúrgico, una reacción de hipersensibilidad que continúa representando un riesgo relevante para pacientes y profesionales. **Objetivo:** Identificar los criterios actuales sobre la alergia al látex y su impacto en la planta quirúrgica, evaluando el nivel de conocimiento y las medidas de prevención aplicadas por técnicos y licenciados en Instrumentación Quirúrgica. **Materiales y método:** Se empleó un diseño descriptivo, transversal y de enfoque cualitativo, con muestreo no probabilístico y accidental, mediante un cuestionario anónimo, cerrado, dicotómico y de opciones múltiples dirigido a personal de una clínica de CABA. **Resultados:** El 88,9% considero que la falta de insumos libres de látex podría ocasionar un evento adverso grave. Asimismo, el 63% estuvo totalmente de acuerdo en que las políticas públicas facilitarían la transición hacia quirófanos libres de látex. Estos datos reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de reducir la exposición. **Conclusión:** El fortalecimiento de políticas institucionales y la educación continua son clave para garantizar entornos quirúrgicos seguros y libres de alérgenos.
Palabras clave: Alergia al látex; Seguridad del paciente; Instrumentación quirúrgica; Bioseguridad; Látex-free.

Abstract

Introduction: This Final Integrative Project addresses latex allergy in the surgical setting, a hypersensitivity reaction that remains a significant risk for both patients and professionals. **Objective:** To identify current criteria regarding latex allergy and its impact on the surgical department, assessing the level of knowledge and preventive measures implemented by surgical technologists and licensed operating room technologists. **Materials and Methods:** A descriptive, cross-sectional design with a qualitative, non-probabilistic and accidental sampling approach was used, based on an anonymous, closed, dichotomous and multiple-choice questionnaire administered to staff of a private clinic in CABA. **Results:** A total of 88.9% considered that the lack of latex-free supplies could lead to a cause a serious adverse event. Likewise, 63% strongly agreed that public policies would facilitate the transition to latex-free operating rooms. These data reflect growing awareness of the importance of reducing exposure. **Conclusion:** Strengthening institutional policies and continuous education are key to ensuring safe, allergen-free surgical environments.

Keywords: Latex allergy; Patient safety; Surgical instrumentation; Biosafety; Latex-free

Tabla de contenido

Justificación....3
Planteamiento del Problema de Investigación....4
Objetivo General....5
Objetivos Específicos....6
Marco Teórico....7
Látex de caucho natural....7
Alergia al látex natural....7
Medio ambiente y contaminación por látex....8
Tipos de alergia al látex y manifestaciones clínicas....8
Poblaciones de riesgo....9
Prevención y medidas para quirófanos libres de látex....10
Alternativas libres de látex en material quirúrgico....11
Manejo de la reacción alérgica intraoperatoria....12
Realidad en Argentina y Latinoamérica respecto a políticas “Látex free” en plantas quirúrgicas....13
Implicancias para la práctica quirúrgica....14
Cuadro de operacionalización de variables....15
Instrumento de recolección de datos....19
Diseño Metodológico....20
Análisis de resultados: tablas y gráficos....22
Conclusión....48
Propuesta de mejora....50
Consideraciones Éticas....51
Agradecimientos....52
Anexo I- Cronograma de Actividades....55
Anexo II- Instrumento de recolección de datos....56
Anexo III- Matriz de Datos....62
Anexo IV- Propuesta de mejora....63

Justificación

He elegido trabajar sobre los Criterios actuales sobre la alergia al látex en relación a su impacto en la planta quirúrgica porque considero que se trata de un tema fundamental para garantizar la seguridad del paciente y del equipo de salud. Hay que tomar conciencia que la alergia al látex de caucho natural, también denominada enfermedad al látex, continúa siendo un riesgo en el ámbito hospitalario, y en especial dentro del quirófano, donde el contacto con guantes, sondas, drenajes y otros materiales es constante.

Desde la instrumentación quirúrgica, el conocimiento sobre los insumos alternativos, las acciones para evitar la contaminación y la identificación de los riesgos asociados al uso del látex se vuelve indispensable.

Asegurar un entorno quirúrgico libre de látex no solo contribuye a prevenir reacciones adversas graves en pacientes y profesionales, sino que también fortalece la calidad de la atención, la seguridad institucional y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Además, resulta importante destacar que la alergia al látex afecta tanto a los pacientes como al personal de salud, lo cual implica consecuencias clínicas, emocionales, laborales y económicas.

Prevenir un evento adverso no solo evita complicaciones médicas, sino que también disminuye los tiempos de internación, reduce costos hospitalarios y promueve entornos de trabajo más seguros.

Por último, como futura Licenciada en Instrumentación Quirúrgica, considero que este tema adquiere especial relevancia porque me permite profundizar en medidas preventivas que podré aplicar en mi práctica diaria, aportando no solo a la seguridad del paciente, sino también a la protección del equipo de salud y al fortalecimiento de la cultura de seguridad en el ámbito quirúrgico.

Planteamiento del Problema de Investigación

Criterios actuales sobre la alergia al látex en relación con su impacto en la planta quirúrgica, según Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación Quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025 a quienes se les entregará un cuestionario cerrado.

Objetivo General

Conocer los criterios actuales sobre la alergia al látex en relación con su impacto en la planta quirúrgica según Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación Quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Objetivos Específicos

1. Investigar los materiales alternativos al látex.
2. Indagar los riesgos asociados al uso del látex en entorno quirúrgico.
3. Analizar las acciones para evitar la contaminación en plantas quirúrgicas.

Marco Teórico

Látex de caucho natural

El árbol de caucho o Hevea Brasiliensis que es originario del Amazonas y actualmente su mayor producción se encuentra en el sudeste asiático, es la fuente de la cual se extrae el caucho natural. Cuando este alcanza la madurez a los cinco años aproximadamente, se retira una porción de corteza para exponer los vasos laticíferos, por donde circula su savia, un líquido lechoso, llamado látex, que fluye hacia las canaletas o recipientes colocados en el árbol que luego es transportado a unidades de procesamiento donde se separa del agua y es sometida a diversos procesos como la vulcanización. Este tratamiento con calor, azufre y aceleradores químicos, a 140° - 160 °C, se genera enlaces cruzados entre las moléculas de caucho que resulta en mayor elasticidad, resistencia, viscosidad y firmeza. El látex es utilizado para la fabricación de innumerables artículos con los que los seres humanos entramos en contacto desde que nacemos, sin siquiera darnos cuenta. Esta savia es el mecanismo de defensa del árbol y su composición varía en función de las proteínas que este necesite producir para enfrentar las diferentes amenazas, por lo que existen infinitas combinaciones de proteínas que pueden formar parte de los productos de latex natural y sensibilizarnos. Puede contener más de 250 proteínas de las cuales 60 tienen la capacidad de comportarse como alérgenos y son responsables de los procesos de sensibilización y alergia que pueden conducir a reacciones de distinto grado de severidad, incluso el shock anafiláctico potencialmente mortal. (1,2)

Alergia al látex natural

La alergia al látex es una condición 100% adquirida, no transmisible, que se desarrolla en personas expuestas en forma precoz y/o reiterada a las proteínas alergénicas del látex de caucho natural. Es una reacción de hipersensibilidad inmediata tipo I o retardada tipo IV. La sensibilización dependerá de la susceptibilidad individual, la vía, la frecuencia y la dosis de exposición. El contacto con látex puede ocurrir en forma directa a través de piel y mucosas, por inhalación o por ingestión. La sensibilización cutánea se puede producir por múltiples elementos, como torniquetes, electrodos, guantes, máscaras y fajas. A nivel mucoso, por contacto directo con endotelios y mucosas (oral, vaginal, uretral y rectal), órganos y tejidos internos.

Las proteínas del látex de caucho natural se fijan al polvo de los guantes y, al cambiarlos, volatilizan partículas generando sensibilización por inhalación. En la década del

80, por el auge de las enfermedades infectocontagiosas, como el HIV, los guantes de látex resultaron una excelente barrera de protección, pero así también como consecuencia, en los 90 surge una epidemia de alergia al látex, por lo que se puede inferir como una enfermedad al látex, de origen antropogénica, porque es generada por el hombre y se encuentra dentro de las enfermedades ambientales. (3, 4,5)

Medio ambiente y contaminación por látex

La crisis climática constituye un problema global para la salud pública y pone en riesgo a la humanidad, se producen eventos climáticos extremos, saturación de químicos, degradación de la atmosfera, contaminación del aire, perdida de la biodiversidad y el látex está muy relacionado con todo esto. El sector salud es un factor altamente contaminante. No se puede tener gente sana en un mundo enfermo, hasta que el aire que respiramos no sea totalmente puro, seguiremos teniendo estas enfermedades emergentes (por el calentamiento global se producen inundaciones que devastan una zona, matando depredadores como sapos y variadas especies de aves, por lo que tendremos más mosquitos y con ellos más dengue, y así con muchas otras), obesidad y desnutrición, enfermedades cardiovasculares y respiratorias (cada vez hay más alergias, más asmáticos, más infertilidad)

El impacto del sector salud si no se toman las medidas necesarias es enorme. El problema del látex en los hospitales no solo son los guantes, son las tiritas de los barbijos, zondas, y cantidades de otras cosas. No alcanza con reciclar, el problema del látex es un problema no por que exista, sino por como lo tratamos. Es un residuo que no se degrada, genera enfermedad en las personas, contamina el aire respirable, deteriora los ecosistemas, causa asfixia (principalmente en niños) y genera enfermedad por látex, en toda la población, pero sobre todo en personas expuestas. (5,6,7,8,9)

Tipos de alergia al látex y manifestaciones clínicas

La alergia al látex se presenta principalmente bajo dos mecanismos inmunológicos diferentes: hipersensibilidad inmediata tipo I e hipersensibilidad retardada tipo IV, cada una con características clínicas propias.

Tipo I, mediada por inmunoglobulina E (IgE), ocurre en minutos tras la exposición al alérgeno. Se manifiesta con síntomas como urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmo, asma e incluso anafilaxia. En el ámbito quirúrgico, esta última constituye la complicación más

grave, ya que puede poner en riesgo inmediato la vida del paciente, requiriendo una intervención rápida del equipo de salud.

Tipo IV corresponde a una dermatitis de contacto alérgica, se desarrolla horas o incluso días después del contacto con el látex. Se presenta con enrojecimiento, prurito, descamación y lesiones eccematosas localizadas en la piel, especialmente en manos y áreas de contacto directo con guantes u otros dispositivos médicos.

Es importante diferenciar estas reacciones de la irritación cutánea no alérgica, que puede presentarse en algunos trabajadores de la salud debido al uso prolongado de guantes, sin que exista un mecanismo inmunológico subyacente.

En el contexto quirúrgico, la identificación temprana de las manifestaciones clínicas y la correcta diferenciación entre los tipos de hipersensibilidad resultan fundamentales para implementar medidas preventivas y garantizar la seguridad tanto del paciente como del equipo quirúrgico. (1, 3, 4,5,8)

Poblaciones de riesgo

La alergia al látex no afecta de una manera uniforme a la población general, sino que existen determinados grupos con mayor probabilidad de sensibilización y desarrollo de reacciones adversas.

Pacientes quirúrgicos de alto riesgo: con múltiples procedimientos quirúrgicos desde edades muy tempranas. Los pacientes con malformaciones congénitas, especialmente los que presentan espina bífida y mielomeningocele, han sido identificados como los de mayor prevalencia. Esto se debe a la exposición repetida y prolongada al material de látex en cirugías, sondajes y procedimientos invasivos

Trabajadores de la salud: Médicos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, odontólogos y personal que utiliza guantes o dispositivos médicos con frecuencia presentan un riesgo elevado, dado el contacto diario y reiterado con productos de látex. Se estima que entre un 8 y un 17% del personal sanitario puede presentar sensibilización o alergia clínica, en comparación con la población general, donde la prevalencia es inferior al 1%.

Pacientes con alergias alimentarias: Quienes presentan reactividad cruzada con frutas como banana, kiwi, castaña, palta o papaya pueden desarrollar el denominado síndrome látex-frutas, debido a la reactividad cruzada entre proteínas del látex y de estos alimentos. Asimismo,

pacientes con dermatitis atópica o exposición frecuente a cirugías u hospitalizaciones prolongadas constituyen otro subgrupo vulnerable.

Población infantil hospitalizada: Los niños que requieren hospitalizaciones reiteradas, sobre todo en unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatales, tienen mayor exposición a dispositivos médicos con látex (catéteres, sondas, tubos de ventilación), lo que incrementa el riesgo de sensibilización precoz.

El reconocimiento de estas poblaciones de riesgo resulta esencial en la práctica quirúrgica y hospitalaria, ya que permite implementar estrategias de prevención dirigidas y fomentar el uso de materiales alternativos libres de látex para garantizar la seguridad de los pacientes y del equipo de salud. (5, 10, 11)

Prevención y medidas para quirófanos libres de látex

La prevención constituye la estrategia más efectiva para reducir los riesgos asociados a la alergia al látex en el ámbito hospitalario. En el quirófano, la implementación de políticas "látex free" requieren un abordaje integral que abarque tanto al paciente como al equipo quirúrgico.

En primer lugar, es fundamental la identificación precoz de pacientes en riesgo mediante la anamnesis dirigida (antecedentes de reacciones previas, alergias alimentarias relacionadas, múltiples cirugías o diagnóstico de espina bífida). Una vez detectados, deben ser programados en áreas quirúrgicas libres de látex y con personal previamente informado.

Las medidas clave incluyen:

- Sustitución de guantes de látex por alternativas como nitrilo, vinilo o neopreno.
- Eliminación de dispositivos médicos que contengan látex (catéteres, sondas, cintas elásticas, tapones, adhesivos)
- Rotulación clara de quirófanos y carros de anestesia con la indicación de Látex Free
- Capacitación continua del equipo de salud para reconocer y manejar reacciones alérgicas intraoperatorias
- Protocolos de limpieza que minimicen la exposición a partículas de látex en suspensión, especialmente las provenientes del polvo de los guantes.

La aplicación sistemática de estas estrategias ha demostrado disminuir la incidencia de reacciones adversas intraoperatorias, aumentando la seguridad del paciente y reduciendo la morbilidad asociada a la alergia al látex. (2, 5, 7)

Alternativas libres de látex en material quirúrgico

El reemplazo del látex en el ámbito hospitalario y quirúrgico ha sido posible gracias al desarrollo de materiales sintéticos con propiedades similares o incluso superiores en cuanto a elasticidad, resistencia y biocompatibilidad. Estas alternativas constituyen la base para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales expuestos.

Guantes quirúrgicos y de examen: Estos representan la principal fuente de exposición al látex. Actualmente se dispone de opciones en nitrilo, neopreno, vinilo y poliisopropeno sintético, materiales que ofrecen resistencia mecánica y adecuada sensibilidad táctil. Los guantes de poliisopreno son los más similares al látex natural en cuanto a flexibilidad y ajuste, siendo especialmente recomendados en cirugías de precisión.

Dispositivos médicos y de anestesia: Muchos insumos hospitalarios previamente fabricados en látex han sido sustituidos por alternativas libres de este material. Ejemplos incluyen:

- Catéteres urinarios y venosos de silicona o PVC.
- Máscaras de anestesia de silicona
- Sondas gástricas y endotraqueales de poliuretano.
- Drenajes quirúrgicos en silicona.

Insumos de protección y fijación: Productos de uso frecuente como bandas elásticas, torniquetes, camisolines, vendajes y adhesivos médicos poseen versiones hipoalergénicas en materiales sintéticos que minimizan el riesgo de sensibilización.

Indumentaria y accesorios hospitalarios: Las tiras elásticas de barbijos, gorros, botas y batas descartables pueden contener látex en su composición. En respuesta a esto, la industria ha desarrollado opciones en fibras textiles y materiales sintéticos seguros.

Ventajas y limitaciones: Si bien las alternativas libres de látex representan un avance significativo en seguridad, presentan algunas limitaciones como el mayor costo en comparación con los productos tradicionales y la menor disponibilidad en determinados contextos hospitalarios. No obstante, los beneficios en términos de prevención de reacciones alérgicas y reducción del riesgo ocupacional justifican su implementación en todos los niveles de atención en salud. (8, 11)

Manejo de la reacción alérgica intraoperatoria

La reacción alérgica intraoperatoria por exposición al látex constituye una emergencia médica que puede comprometer la vida del paciente en pocos minutos. Su correcta identificación y tratamiento oportuno son esenciales para reducir la morbimortalidad asociada.

Diagnostico intraoperatorio: La sospecha clínica es el pilar fundamental. Los signos más frecuentes incluyen:

- Manifestaciones cutáneas: eritema, urticaria, prurito, angioedema.
- Manifestaciones respiratorias: broncoespasmo, sibilancias, dificultad ventilatoria.
- Manifestaciones cardiovasculares: hipotensión, taquicardia, arritmias y, en casos severos, shock anafiláctico.

La cronología es clave: los síntomas suelen presentarse minutos después del contacto con guantes, sondas u otros dispositivos que contienen látex.

Tratamiento de emergencia: El manejo se basa en las guías internacionales para anafilaxia:

- Suspensión inmediata de la exposición al látex y retiro del material sospechoso.
- Administración inmediata de adrenalina intramuscular (0,01 mg/Kg, máximo 0,5 mg por dosis en adultos), pudiendo repetirse cada 5- 15 minutos según evolución.
- Asegurar vía aérea, oxigenoterapia al 100% y soporte ventilatorio si es necesario.
- Fluidoterapia rápida con cristaloides para tratar la hipotensión.
- Uso de antihistamínicos H1 y H2, y corticoides intravenosos para disminuir la progresión de los síntomas y prevenir recaídas tardías.

Manejo perioperatorio

- Los pacientes con antecedentes de alergia al látex deben ser identificados en la historia clínica y programados en quirófanos latex free.
- El equipo quirúrgico debe estar entrenado en reconocer los síntomas y activar de inmediato el código de emergencia anafiláctica.
- Una vez estabilizado el paciente, se recomienda derivación al servicio de alergología para estudios confirmatorios (pruebas cutáneas, IgE especifica)

Prevención secundaria Todo paciente que ha presentado reacción intraoperatoria debe ser documentado en la historia clínica y portar identificación de riesgo (pulsera de alerta medica) para evitar nuevas exposiciones. (3, 8)

Realidad en Argentina y Latinoamérica respecto a políticas "Látex free" en plantas quirúrgicas

En Latinoamérica, la implementación de plantas quirúrgicas libres de látex constituye un desafío complejo debido a la diversidad de sistemas sanitarios, las limitaciones presupuestarias y las diferencias en la accesibilidad a insumos hospitalarios alternativos.

Argentina: Si bien no existe aún una normativa nacional obligatoria que regule el uso de materiales "latex free" en todos los hospitales y clínicas, se han desarrollado iniciativas locales en instituciones públicas y privadas. En algunos centros de alta complejidad, especialmente en pediatría y cirugía cardiovascular, se promueve la utilización de insumos libres de latex, dado el alto riesgo de sensibilización en pacientes sometidos a múltiples procedimientos quirúrgicos. La Asociación Argentina de Alergia al Latex ha emitido recomendaciones sobre la necesidad de identificar a los pacientes de riesgo y generar protocolos de prevención. Sin embargo, la falta de recursos y de financiamiento especifico dificulta la implementación universal.

Contexto en Latinoamérica: En países como Brasil, México y Chile se han publicado reportes de alergia al latex en profesionales de la salud y pacientes quirúrgicos, lo que impulso la creación de guías y alertas hospitalarias. En Brasil, la Sociedad Brasileira de Alergia e Inmunología recomienda quirófanos libres de latex para pacientes sensibilizados. En México, algunos hospitales de referencia cuentan con protocolos de sustitución progresiva hacia materiales alternativos, aunque aún de manera parcial. Chile ha avanzado en programas hospitalarios de seguridad del paciente que incluyen el registro de alergias, entre ellas la alergia al latex.

Limitaciones comunes en la región.

- Acceso restringido a insumos libres de latex debido a costos más elevados
- Falta de normativas obligatorias nacionales que unifiquen criterios en todos los hospitales
- Desigualdad entre el sector público y privado, siendo más factible en instituciones privadas de gran complejidad.
- Escasa formación del personal de salud respecto a la identificación y manejo del riesgo asociado al latex

Perspectivas futuras: El incremento de casos reportados de alergia al latex y la tendencia mundial hacia hospitales seguros ha generado una mayor conciencia en la región. Se prevé que,

a través de políticas públicas, acuerdos con la industria y programas de bioseguridad hospitalaria, la transición hacia entornos quirúrgicos “latex free” sea cada vez más alcanzable en Latinoamérica (9, 10, 11)

Implicancias para la práctica quirúrgica

La alergia al látex constituye una problemática sanitaria, ocupacional y ambiental de creciente relevancia en el ámbito quirúrgico. La exposición continua a ese material, tanto por pacientes como del personal de salud, representan un riesgo que exige medidas preventivas efectivas y sostenidas en el tiempo. La sensibilización al látex puede derivar en reacciones adversas de diversa gravedad, lo que convierte a la identificación temprana y al manejo adecuado en pilares esenciales para garantizar la seguridad en los procedimientos.

En este sentido, la práctica quirúrgica moderna requiere incorporar criterios actualizados para la evaluación del riesgo, la identificación de pacientes sensibles y la aplicación de protocolos específicos que contemplen el uso de insumos alternativos libres de látex. La disponibilidad de materiales adecuados, la correcta señalización de los espacios quirúrgicos y el cumplimiento riguroso de las normas de bioseguridad son componentes fundamentales de una atención segura y de calidad.

Asimismo, la problemática del látex trasciende el plano técnico y demanda una mirada integral que involucre educación continua, planificación institucional y compromiso ambiental. Promover políticas hospitalarias orientadas a la progresiva transformación hacia entornos quirúrgicos libres de látex constituye una oportunidad para fortalecer la cultura de la seguridad, mejorar la calidad asistencial y proteger tanto al paciente como al equipo de salud.

De esta manera, las implicancias para la práctica quirúrgica abarcan no solo la actualización de los conocimientos profesionales, sino también la adopción de estrategias institucionales que favorezcan una medicina más segura, equitativa y sustentable, en consonancia con los estándares internacionales y las necesidades de la población en riesgo (6, 8)

Cuadro de operacionalización de variables

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Categoría
Edad				21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años Más de 51años
Sexo				Femenino Masculino
Criterios actuales sobre alergia al látex	Conjunto de conocimientos y prácticas basadas en la evidencia científica vigente sobre la identificación, prevención y manejo de la alergia al látex en el ámbito quirúrgico.	Conocimiento Clínico	¿Identifica Usted los síntomas más frecuentes de la alergia al látex?	Tos Picazón Prurito Sequedad en la piel Dolor de cabeza Urticaria Anafilaxia
			¿Reconoce Usted cuáles son las poblaciones de mayor riesgo de ser alérgicas al látex?	Niños prematuros Espina Bífida Personal de salud Pacientes oncológicos Pacientes con múltiples cirugías
			¿Considera Usted probable que el personal de salud desarrolle enfermedad por látex?	Probablemente desarrolle Ocasionalmente desarrolle Nunca desarrolle

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Categoría
			¿Está Usted de acuerdo en que si a la planta quirúrgica ingresa un paciente con Espina Bífida se le asigna un quirófano látex free?	Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
		Alternativas y recursos	¿Considera Usted que los insumos libres de látex mantienen la misma calidad funcional que los tradicionales?	Son de mejor calidad Mantienen la misma calidad Son de más baja calidad
			¿Percibe Usted limitaciones en el acceso a insumos libres de látex?	Frecuentemente percibe Ocasionalmente percibe Nunca percibe
			Dentro de los materiales alternativos al látex ¿Usted, de cual dispone en su planta quirúrgica?	Nitrilo Caucho Neopreno Poliuretano Plástico Silicona
		Vida cotidiana	¿Conoce Usted los riesgos que produce la acumulación de látex en el organismo por estar expuesto a éste desde edades muy tempranas?	Si conoce No conoce
			En su vida cotidiana ¿utiliza Usted globos de manera decorativa?	Siempre utilizo Frecuentemente utilizo A veces utilizo Nunca utilizo

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Categoría
			¿Considera Usted que los elementos que nos rodean en la vida cotidiana que contienen látex son nocivos para nuestra salud?	Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
			La utilización de chupetes de látex en bebes afecta a la acumulación de este material en el cuerpo	Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
			¿Considera Usted que los alimentos con reactividad cruzada (ej. banana, kiwi, palta) representan un riesgo adicional?	Siempre lo considero A veces lo considero Nunca lo considero
Impacto en la planta quirúrgica	Consecuencias organizativas, logísticas y de seguridad que genera la presencia de pacientes y personal con alergia al látex en la planta quirúrgica, así como las medidas adoptadas para su manejo	Organización y protocolos	¿Está Usted de acuerdo en que los casos de pacientes con alergia al látex declarada solo pueden tratarse en quirófanos que hayan sido ventilados por 4 hs?	Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
			¿Con que frecuencia se reportan eventos adversos relacionados con látex en su planta quirúrgica?	Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Categoría
			¿Existe en su servicio alguna identificación de quirófanos “libres de látex”?	Siempre Nunca
		Recursos y disponibilidad	En la planta quirúrgica, ¿hay disponibilidad permanente de insumos libres de látex?	Siempre hay disponibilidad Ocasionalmente hay disponibilidad Nunca hay disponibilidad
			¿Considera Usted que el costo de los insumos libres de látex representa una dificultad para su implementación?	Siempre lo considero A veces lo considero Nunca lo considero
		Seguridad y percepción del equipo	¿Alguna vez se detectó una reacción adversa por látex en el personal de la planta quirúrgica?	Se detectaron muchos casos Se detectaron unos pocos casos Nunca se detectó
			¿Considera Usted que los quirófanos libres de látex mejorarían la seguridad del paciente?	Siempre lo considero A veces lo considero Nunca lo considero
			¿Cree Usted que quirófanos libres de látex reducen riesgos ocupacionales en el equipo de salud?	Siempre lo considero A veces lo considero Nunca lo considero

Variable	Definición	Dimensión	Indicador	Categoría
			¿Considera Usted importante la transformación de toda la planta quirúrgica a "látex free"?	Lo considero muy importante Lo considero poco importante Lo considero sin importancia
			¿Considera Usted que la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex es percibida como viable en su institución?	Siempre lo considero A veces lo considero Nunca lo considero
			¿Cree Usted que la ausencia de insumos libres de látex podría generar un evento adverso grave?	Si lo creo No lo creo
			¿Está Usted de acuerdo en que la implementación de políticas públicas facilitaría la transición a quirófanos libres de látex?	Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Instrumento de recolección de datos
(Ver anexo II)

Diseño Metodológico

Tipo de estudio: Enfoque cualitativo, descriptivo, prospectivo, transversal, no probabilístico y accidental

Área de estudio: Importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universo: Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Muestra: 27 Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Unidad de Análisis: Cada uno de los 27 Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Criterios de Inclusión: Licenciados/as en instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aceptaron participar de esta investigación en el mes de diciembre de 2025

Técnicos/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aceptaron participar de esta investigación en el mes de diciembre de 2025.

Criterios de exclusión: Enfermeras de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Médicos Cirujanos de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Jefe de Quirófano de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Camilleros de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Residentes de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Médicos Anestesiólogos de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Muestreo: No probabilístico y accidental

Método de Recolección de datos: Cuestionario anónimo, cerrado, dicotómico y de respuestas múltiples.

Plan de Tabulación y Análisis: Realización de tablas de frecuencias y gráficos de porcentaje.

Análisis de resultados: tablas y gráficos

Tabla n° 1: Distribución de frecuencias de acuerdo al sexo de los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Sexo	**Unidades**	***f***	f_1
Masculino	0	0	0
Femenino	27	27	1
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n°1: Distribución de porcentajes de acuerdo al sexo de los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis el 100% respondió femenino.

Tabla n° 2: Distribución de frecuencias de acuerdo a la edad de los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Edad	Unidades	f	f_1
21 a 30	2	2	0,074
31 a 40	8	8	0,296
41 a 50	11	11	0,407
Mas de 51	6	6	0,222
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 2: Distribución de porcentajes de acuerdo a la edad de los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las respuestas obtenidas deducimos que solo 2 (7.34%) de las 27 unidades de análisis son menores de 30 años y el resto mayores de esa edad.

Tabla n° 3: Distribución de frecuencias de acuerdo a los síntomas más frecuentes de alergia al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Síntomas más frecuentes de alergia al látex	Unidades	f	f_1
Tos	9	9	0,091
Picazón	23	23	0,234
Prurito	17	17	0,173
Sequedad en la piel	16	16	0,163
Dolor de cabeza	3	3	0,031
Urticaria	15	15	0,153
Anafilaxis	15	15	0,153
Total	98	98	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 3: Distribución de porcentajes de acuerdo a los síntomas más frecuentes de alergia al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del grafico: La mayoría de los encuestados (85,2%) identifico la picazón como síntoma frecuente de alergia al látex, seguida por prurito, sequedad en la piel y urticaria. Solo 15 de las 27 unidades de análisis (55,6%) reconocieron la anafilaxia.

Tabla n° 4: Distribución de frecuencias de acuerdo a la población de riesgo alérgica al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.

Población de riesgo alérgica al látex	**Unidades**	***f***	***f*** $_1$
Niños prematuros	9	9	0,136
Espina Bífida	14	14	0,212
Personal de salud	20	20	0,303
Pacientes oncológicos	11	11	0,166
Pacientes con múltiples cirugías	12	12	0,181
Total	66	66	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 4: Distribución de porcentajes de acuerdo a la población de riesgo alérgica al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de los encuestados (74,1%) identifica al personal de salud como la población de mayor riesgo de contraer alergia al látex. Solo la mitad reconoce los dos grupos de riesgo más relevantes, Espina Bífida (51,9%) y pacientes con múltiples cirugías (44,4%) mientras que se atribuye erróneamente mayor riesgo a niños prematuros (33,3%) y pacientes oncológicos (40,7%), que no constituyen poblaciones de riesgo según la evidencia científica.

Tabla n° 5: Distribución de frecuencias de acuerdo a la probabilidad del personal de salud a desarrollar enfermedad por látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

probabilidad del personal de salud a desarrollar enfermedad por látex	Unidades	*f*	f_1
Probablemente desarrolle	16	16	0,592
Ocasionalmente desarrolle	10	10	0,370
Nunca desarrolle	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 5: Distribución de porcentajes de acuerdo a la probabilidad del personal de salud a desarrollar enfermedad por látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis 16 (59,3%) consideran que el personal de salud pueda desarrollar enfermedad por látex, mientras que 10 (37%) opinó que ocasionalmente pueda desarrollarlo y solo 1 (3,7%) piensa que nunca sucederá esto.

Tabla n° 6: Distribución de frecuencias de acuerdo a la asignación de quirófano látex free a pacientes con Espina Bífida según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Asignación de quirófano látex free a pacientes con Espina Bífida	Unidades	f	f_1
Totalmente de acuerdo	22	22	0,814
Totalmente en desacuerdo	5	5	0,185
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 6: Distribución de porcentajes de acuerdo a la asignación de quirófano látex free a pacientes con Espina Bífida según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis 22 (81,5%) manifestó estar totalmente de acuerdo en que a los pacientes con Espina Bífida se les debe asignar un quirófano “látex free”, mientras que 5 (18,5%) estuvieron totalmente en desacuerdo.

Tabla n° 7: Distribución de frecuencias de acuerdo a la calidad funcional de los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Calidad funcional de los insumos libres de látex	**Unidades**	***f***	***f*₁**
Son de mejor calidad	9	9	0,333
Mantienen la misma calidad	17	17	0,630
Son de más baja calidad	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 7: Distribución de porcentajes de acuerdo a la calidad funcional de los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de los encuestados (63%) considera que los insumos libres de látex mantienen la misma calidad funcional que los tradicionales, mientras que un 33,3% los percibe como de mejor calidad y solo un 3,7 % opina que son de mejor calidad.

Tabla n° 8: Distribución de frecuencias de acuerdo a la disponibilidad de acceso a los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Disponibilidad de acceso a insumos libres de látex	**Unidades**	***f***	f_1
Frecuentemente percibe	7	7	0,260
Ocasionalmente percibe	16	16	0,593
Nunca percibe	4	4	0,148
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 8: Distribución de porcentajes de acuerdo a la disponibilidad de acceso a los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Se puede analizar que más de la mitad de los encuestados (59,3%) manifiesta percibir ocasionalmente limitaciones en el acceso a insumos libres de látex, mientras que un 25,9% las percibe frecuentemente y un 14,8 % nunca.

Tabla n° 9: Distribución de frecuencias de acuerdo a la disponibilidad de insumos alternativos al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Disponibilidad insumos alternativos al látex	Unidades	f	f_1
Nitrilo	23	23	0,383
Caucho	1	1	0,016
Neopreno	9	9	0,15
Poliuretano	6	6	0,1
Plástico	6	6	0,1
Silicona	15	15	0,25
Total	60	60	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 9: Distribución de porcentajes de acuerdo a la disponibilidad de insumos alternativos al látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Dentro de las 27 unidades de análisis, la mayoría (85,2%) indico disponer de nitrilo como material alternativo al látex, seguido de la silicona (55,6%) y el neopreno (33,3%). En menor medida se mencionó el poliuretano (22,2%). Algunos encuestados seleccionaron caucho (3,7%) y plástico (22,2%)

Tabla n° 10: Distribución de frecuencias de acuerdo al conocimiento del riesgo de acumulación de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Conocimiento del riesgo de acumulación de latex	Unidades	f	f_1
Si conoce	11	11	0,407
No conoce	16	16	0,592
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 10: Distribución de porcentajes de acuerdo al conocimiento del riesgo de acumulación de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de los encuestados (59.3%) manifestó conocer los riesgos asociados a la exposición al látex, mientras que un 40,7% indico no tener conocimiento al respecto.

Tabla n° 11: Distribución de frecuencias de acuerdo a la utilización de globos en la vida cotidiana según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Utilización de globos en la vida cotidiana	**Unidades**	***f***	f_1
Siempre utilizo	0	0	0
Frecuentemente utilizo	5	5	0,185
A veces utilizo	18	18	0,666
Nunca utilizo	4	4	0,148
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 11: Distribución de porcentajes de acuerdo a la utilización de globos en la vida cotidiana según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Análisis del gráfico: La mayoría de los encuestados (66,7%) manifestó que a veces utiliza globos con fines decorativos en su vida cotidiana, mientras que un 18,5% lo hace con mayor frecuencia y un 14,8% indico no utilizarlos nunca.

Tabla n° 12: Distribución de frecuencias de acuerdo al conocimiento de nocividad de los elementos que contienen látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Conocimiento de nocividad de los elementos que contienen látex	**Unidades**	***f***	***f*₁**
Siempre lo considero	2	2	0,074
A veces lo considero	16	16	0,592
Nunca lo considero	9	9	0,333
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 12: Distribución de porcentajes de acuerdo al conocimiento de nocividad de los elementos que contienen látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis la mayoría (59,3%) señaló que a veces considera nocivos los elementos con látex presentes en la vida cotidiana, mientras que un 33,3% nunca los considera perjudiciales y apenas un 7,4% manifestó tenerlo siempre en cuenta.

Tabla n° 13: Distribución de frecuencias de acuerdo a la utilización de chupetes de látex en bebes según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Utilización de chupetes de látex en bebes	**Unidades**	***f***	f_1
Totalmente de acuerdo	7	7	0,260
De acuerdo	10	10	0,370
En desacuerdo	10	10	0,370
Totalmente en desacuerdo	0	0	0
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 13: Distribución de porcentajes de acuerdo a la utilización de chupetes de látex en bebes según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Las respuestas se encuentran divididas, ya que un 62,9% de las unidades de análisis (25,9% totalmente de acuerdo y 37% de acuerdo) considera que el uso de chupetes de látex en bebes puede contribuir a la acumulación de este material en el organismo, mientras que el 37% restante está en desacuerdo.

Tabla n° 14: Distribución de frecuencias de acuerdo a los alimentos con reactividad cruzada según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Alimentos con reactividad cruzada	**Unidades**	f	f_1
Siempre lo considero	2	2	0,074
A veces lo considero	11	11	0,407
Nunca lo considero	14	14	0,518
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 14: Distribución de porcentajes de acuerdo a los alimentos con reactividad cruzada según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Mas de la mitad de las 27 unidades de análisis (51,9%) manifestó que nunca considera a los alimentos con reactividad cruzada como un riesgo adicional, mientras que un 40,7% lo considera solo a veces y apenas un 7,4% siempre lo tiene en cuenta.

Tabla n° 15: Distribución de frecuencias de acuerdo a la asignación de quirófanos a pacientes alérgicos según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Asignación de quirófanos a pacientes alérgicos	**Unidades**	***f***	***f*₁**
Totalmente de acuerdo	14	14	0,518
De acuerdo	8	8	0,296
En desacuerdo	4	4	0,148
Totalmente en desacuerdo	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 15: Distribución de porcentajes de acuerdo a la asignación de quirófanos a pacientes alérgicos según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Mas de la mitad de los encuestados (51,9%) está totalmente de acuerdo con que los pacientes con alergia al látex deben ser tratados en quirófanos ventilados durante al menos 4 horas antes de su uso. Y un 29,6% manifestó estar de acuerdo. En contraste, un 14,8% está en desacuerdo y un 3,7% está totalmente en desacuerdo.

Tabla n° 16: Distribución de frecuencias de acuerdo a la frecuencia de reporte de eventos adversos según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Reporte de eventos adversos	**Unidades**	***f***	***f*₁**
Frecuentemente	1	1	0,037
Ocasionalmente	18	18	0,666
Nunca	8	8	0,296
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 16: Distribución de porcentajes de acuerdo a la frecuencia de reporte de eventos adversos según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de los encuestados (66,7%) indico que ocasionalmente se reportan eventos adversos relacionados con látex en su planta quirúrgica, mientras que un 29,6% afirmo que nunca se registran estos incidentes y solo un 3,7% refirió que ocurren frecuentemente.

Tabla n° 17: Distribución de frecuencias de acuerdo a la identificación de quirófanos látex free según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Identificación de quirófanos látex free	**Unidades**	***f***	f_1
Siempre	8	8	0,296
Nunca	19	19	0,703
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 17: Distribución de porcentajes de acuerdo a la identificación de quirófanos látex free según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de las 27 unidades de análisis (70,4%) manifestó que no existe señalización o identificación de quirófanos libres de látex en su servicio, mientras que solo un 29,6% indico que si cuentan con esta identificación.

Tabla n° 18: Distribución de frecuencias de acuerdo a la disponibilidad de productos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Disponibilidad de productos libres de latex	Unidades	f	f_1
Siempre hay disponibilidad	17	17	0,629
Ocasionalmente hay disponibilidad	7	7	0,259
Nunca hay disponibilidad	3	3	0,111
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 18: Distribución de porcentajes de acuerdo a la disponibilidad de productos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis encuestadas, la mayoría (63%) indicó que siempre hay disponibilidad de insumos libres de látex en la planta quirúrgica, mientras que un 25,9% señalo que la disponibilidad es ocasional, y un 11,1% manifestó que nunca los hay.

Tabla n° 19: Distribución de frecuencias de acuerdo al costo de los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Costo de los insumos libres de latex	**Unidades**	***f***	f_1
Siempre lo considero	8	8	0,296
A veces lo considero	15	15	0,555
Nunca lo considero	4	4	0,148
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 19: Distribución de porcentajes de acuerdo al costo de los insumos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis, 15 (55,6%) manifestó que a veces considera el costo de los insumos libres de látex como una dificultad para su implementación, mientras que 8 (29,6%) lo considera siempre un obstáculo y solo 4 (14,8%) nunca lo percibe como un problema.

Tabla n° 20: Distribución de frecuencias de acuerdo a las reacciones adversas por látex en el personal de la planta quirúrgica según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Reacciones adversas por látex en el personal de la planta quirúrgica.	**Unidades**	***f***	f_1
Se detectaron muchos casos	3	3	0,111
Se detectaron unos pocos casos	13	13	0,481
Nunca se detecto	11	11	0,407
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 20: Distribución de porcentajes de acuerdo a las reacciones adversas por látex en el personal de la planta quirúrgica según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Los resultados muestran que la mayoría (48,1%) manifestó haber tenido unos pocos casos de reacciones adversa al látex en el personal, mientras que un 40,7% indico no haber registrado ningún caso y un 11,1% señalo la existencia de varios casos.

Tabla n° 21: Distribución de frecuencias de acuerdo a la seguridad del paciente en quirófanos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Seguridad del paciente en quirófanos libres de látex.	**Unidades**	***f***	***f*** $_1$
Siempre lo considero	18	18	0,666
A veces lo considero	8	8	0,296
Nunca lo considero	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 21: Distribución de porcentajes de acuerdo a la seguridad del paciente en quirófanos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La gran mayoría de los encuestados (66,7%) considera que los quirófanos libres de látex mejorarían la seguridad del paciente, mientras que un 29,6% lo considera solo en algunas ocasiones y un 3,7% no lo percibe como un factor relevante.

Tabla n° 22: Distribución de frecuencias de acuerdo a los riesgos ocupacionales en quirófanos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Riesgos ocupacionales en quirófanos libres de látex.	**Unidades**	***f***	f_1
Siempre lo considero	10	10	0.370
A veces lo considero	16	16	0,592
Nunca lo considero	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 22: Distribución de porcentajes de acuerdo a los riesgos ocupacionales en quirófanos libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis encuestadas la mayoría (59,3%) considera que los quirófanos libres de látex reducen los riesgos ocupacionales en el equipo de salud, mientras que un 37% lo percibe así solo en algunas ocasiones y un 3,7% no lo considera un factor relevante.

Tabla n° 23: Distribución de frecuencias de acuerdo a la transformación de la planta quirúrgica a "látex free" según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Transformación de la planta quirúrgica a "látex free"	**Unidades**	***f***	f_1
Lo considero muy importante	14	14	0,518
Lo considero poco importante	10	10	0,370
Lo considero sin importancia	3	3	0,111
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 23: Distribución de porcentajes de acuerdo a la transformación de la planta quirúrgica a "látex free" según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis, más de la mitad 14 (51,9%) considera muy importante la transformación completa de la planta quirúrgica a un entorno "látex free", mientras que 10 (37%) la considera poco importante y 3 (11,1%) lo considera sin importancia. Un porcentaje elevado de participantes (48%) considera este cambio como poco o sin importancia.

Tabla n° 24: Distribución de frecuencias de acuerdo a la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Transición hacia quirófanos totalmente libres de látex	**Unidades**	***f***	***f*** $_1$
Siempre lo considero	3	3	0,111
A veces lo considero	14	14	0,518
Nunca lo considero	10	10	0,370
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 24: Distribución de porcentajes de acuerdo a la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: Ante la pregunta sobre la viabilidad de la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex, el 51,9% de las unidades de análisis respondió que a veces lo considera viable, mientras que un 11,1% siempre lo considera viable y un 37% nunca lo considera posible en la institución. Más de un tercio (37%) considera inviable esta transición.

Tabla n° 25: Distribución de frecuencias de acuerdo a la posible generación de evento adverso grave según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Generación de un evento adverso grave	Unidades	f	f_1
Si lo creo	24	24	0,888
No lo creo	3	3	0,111
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 25: Distribución de porcentajes de acuerdo a la posible generación de evento adverso grave según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: De las 27 unidades de análisis 24 (88,9%) considera que la ausencia de insumos libres de látex podría generar un evento adverso grave y 3 (11,1%) no lo considera así.

Tabla n° 26: Distribución de frecuencias de acuerdo a la implementación de políticas públicas según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.

Implementación de políticas publicas	**Unidades**	f	f_1
Totalmente de acuerdo	17	17	0,630
De acuerdo	9	9	0,333
En desacuerdo	1	1	0,037
Total	27	27	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico n° 26: Distribución de porcentajes de acuerdo a la implementación de políticas públicas según los Técnicos/as y Licenciados/as en Instrumentación quirúrgica de importante Clínica Privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 2025.



Análisis del gráfico: La mayoría de las 27 unidades de análisis encuestadas (63%) se mostró totalmente de acuerdo en que la implementación de políticas públicas facilitaría la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex, mientras que el 33,3% coincidió parcialmente y solo un 3,7% expreso estar en desacuerdo.

Conclusión

El presente estudio permitió identificar los criterios actuales sobre la alergia al látex y su impacto en la planta quirúrgica, evidenciando que continúa siendo una problemática vigente que compromete la seguridad del paciente y del equipo de salud. Los resultados obtenidos muestran que, si bien una parte significativa del personal posee conocimientos básicos sobre la alergia al látex, aún persisten brechas importantes tanto en la identificación de grupos de riesgo como en la comprensión de la gravedad de las reacciones. Por ejemplo, aunque el 85,2% reconoció síntomas cutáneos frecuentes, solo el 55,6% identificó la anafilaxia como la manifestación más grave.

Asimismo, se observaron inconsistencias en el reconocimiento de poblaciones de riesgo: solo el 51,9% identificó correctamente a los pacientes con Espina Bífida y el 44,4% a quienes presentan múltiples cirugías, mientras que se atribuyeron erróneamente riesgos elevados a niños prematuros y pacientes oncológicos. Este hallazgo evidencia lagunas conceptuales que requieren fortalecimiento formativo.

En relación con las condiciones materiales de trabajo, el 59,3% manifestó percibir limitaciones en el acceso a insumos libres de látex y un 55,6% refirió que el costo representa una dificultad para su implementación, señalando barreras institucionales que aún obstaculizan la adopción plena de entornos “látex free”. A pesar de ello, el 88,9% de los encuestados reconoció que la falta de insumos alternativos podría ocasionar un evento adverso grave, lo que demuestra una clara percepción del riesgo clínico asociado.

De forma complementaria, el 63% coincidió en que la implementación de políticas públicas facilitaría la transición hacia quirófanos libres de látex, evidenciando que el personal reconoce la necesidad de un respaldo institucional y normativo para avanzar hacia prácticas más seguras.

En síntesis, los resultados reflejan que, aunque existe una conciencia creciente sobre los riesgos del látex, persisten desafíos vinculados al conocimiento técnico, la disponibilidad de insumos alternativos y la ausencia de protocolos estandarizados. Por ello, se concluye que la transición hacia plantas quirúrgicas completamente libres de látex es un objetivo alcanzable, siempre que se fortalezcan las políticas institucionales, se garantice la accesibilidad a materiales alternativos y se promueva la educación continua del equipo de salud.

Avanzar hacia entornos “látex free” no solo optimiza la calidad asistencial, sino que contribuye a la protección ocupacional y a la seguridad de los pacientes, alineándose con los estándares internacionales de bioseguridad.

Propuesta de mejora

Se elaboro una guía de actualización en formato de folleto.

Esta guía tiene como propósito ser una herramienta práctica, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la alergia al látex y su impacto en el área quirúrgica.

Surge como respuesta a las brechas identificadas en los resultados de este estudio, con el objetivo de promover prácticas mas seguras y fortalecer las medidas de prevención dentro del equipo de salud.

Consideraciones Éticas

El presente trabajo se desarrolló respetando los principios éticos fundamentales de la investigación en salud: **respeto por las personas, beneficencia y justicia**, conforme a los lineamientos del **Código de Ética de la Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki)** y a las **normas nacionales vigentes**.

Dado que la investigación no involucró intervención directa con pacientes, sino el análisis de información de carácter académico y datos de dominio público, no se consideró necesario requerir autorización de un comité de ética hospitalario. No obstante, se garantizó en todo momento la **confidencialidad de la información**, evitando la inclusión de datos personales que pudieran permitir la identificación de individuos o instituciones.

El instrumento de recolección de datos fue administrado de manera voluntaria, garantizando el **consentimiento informado implícito** de los participantes, quienes fueron previamente informados sobre los objetivos del estudio, la finalidad académica de los resultados y la utilización anónima de las respuestas.

Asimismo, se respetaron los principios establecidos en la **Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales**, la **Ley N.º 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado**, y las disposiciones del **Comité de Bioética de la Universidad Abierta Interamericana**.

Finalmente, se declara que el presente trabajo es de **autoría original**, no contiene plagio y fue elaborado exclusivamente con fines académicos, respetando la propiedad intelectual según la **Ley N.º 11.723 de Derechos de Autor**.

Agradecimientos

La motivación que me llevó a realizar este trabajo radica en la reflexión e interés que me despiertan las problemáticas y dudas que se presentan sobre la alergia al látex, tanto para los pacientes como así también para el personal de salud. A la vez siento un compromiso y convicción de aportar desde mi formación profesional e investigación, a un tema sobre el que aún queda mucho por visibilizar y mejorar.

Quiero agradecer, en primer lugar, a mi tutora de tesis, Lic. Patricia Barroetaveña, quien me ha acompañado y motivado a lo largo del proceso de investigación, brindándome generosamente su tiempo, respondiendo cada inquietud que se presentaba y aportando constructivamente a esta investigación. Su guía amable en la elección del tema, planteo del problema, así como también una posible conclusión y propuesta de mejora, fue indispensable para que este trabajo llegara a buen puerto. Ella y Marcelo Montenegro fueron las guías esenciales para que este proyecto pueda ser concretado.

Por otro lado, agradecer al cuerpo docente de la UAI. Cuando inicie la Licenciatura en el año 2020, afrontamos un momento particularmente complejo: iniciando una pandemia que nos obligó a adaptarnos a la virtualidad, con desafíos tanto para los docentes, que tuvieron que modificar su manera de enseñar, como para nosotros, como alumnos. Personalmente me resulto muy difícil dicha modalidad y es por eso que este trabajo es entregado un tiempo después de haber culminado la cursada, debiendo reescribirlo por completo debido a los cambios en las condiciones del trabajo final. Extiendo mi agradecimiento a compañeros y compañeras que me acompañaron durante todo este proceso.

Mi reconocimiento especial, al director de la carrera, Lic. Braian Basconcell y al Lic. José Burda, por la especial dedicación a responder inquietudes, por el conocimiento teórico brindado y por impulsar la participación y reflexión del estudiantado aportando y transmitiendo el amor a la profesión.

Por último, agradezco profundamente a Dany, mi pareja, quien me alentó a concluir esto, me acompaño en cada instancia y siempre me espero con la cena lista cuando volvía a casa cansada. A mi hijo Matías y mi nuera Yesica. A Lore, mi compañera de la oficina que se banco todos mis nervios y hasta me ayudo a practicar con la encuesta sin saber absolutamente nada del látex. A mi familia y amigos. A todos ellos por siempre confiar en mí, apoyarme y alentarme a que nunca baje los brazos, recordándome que si se puede y siempre ir por más.

Bibliografía

1. Zarauza A. Hipersensibilidad al látex. Arch Alerg Inmunol Clín [Internet]. 2024 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.archivos.org.ar/contenido/art.php?recordID=Mjc5MQ==
2. Asociación Argentina de Alergia al Látex (AAAL). Sitio oficial [Internet]. Argentina; 2015 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://saludsinlatex.com.ar/index.html
3. Mayo Clinic. Alergia al látex [Internet]. Arizona: Mayo Clinic; 2024 nov [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/latex-allergy/symptoms-causes/syc-20374287
4. Anda M, Gómez B, Lasa E, Arroabarren E, Garrido S, Echechipía S. Alergia al látex: manifestaciones clínicas y reactividad cruzada. SciELO España [Internet]. 2003 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000400010
5. López KA, Sarraquigne MP, Gervasoni ME, Mariño AI, Menéndez Porfilo B, Sasia L, et al. Recomendaciones para el manejo de la alergia al látex en pediatría. Arch Argent Pediatr. 2024;122(6):e20241043. doi:10.5546/aap.2024-10431
6. Weiskind W, et al. Los hábitos seguros también son sin látex. Ciclo educativo AAAL [Internet]. Buenos Aires; 2025 ago 25 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5-eAKjBYNIo
7. Weiskind W, et al. La alergia al látex como enfermedad ambiental. Ciclo educativo AAAL [Internet]. Buenos Aires; 2025 jun [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KIyOvOkC6fA
8. Ahmed S, Savic L. Látex: reacciones alérgicas perioperatorias. BJA Educ [Internet]. 2020 oct [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.bjaed.org/article/S2058-5349(20)30115-3/fulltext
9. Asociación Brasileña de Alergia e Inmunología (ASBAI). Látex: reacción alérgica de prurito a anafilaxia [Internet]. Brasil; 2018 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://asbai.org.br/latex-reacao-alergica-que-vai-de-prurido-a-anafilaxia/
10. Bedolla-Barajas M, Machuca-Rincón ML, Morales-Romero J, Macriz-Romero N, Madrigal-Beas IM, Robles-Figueroa M, et al. Prevalencia de alergia al látex en trabajadores de la salud. Rev Alerg Mex [Internet]. 2017 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/ram/v64n4/2448-9190-ram-64-04-0430.pdf

11. Álvarez D, Rojas H, Silva-Hirschberg C. Alergia al látex: puesta al día. Rev Chil Dermatol [Internet]. 2016 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.rcderm.org/index.php/rcderm/article/view/126/77
12. Parisi C, Lucini MC, Picardi I, Díaz S, Baltazar-Gómez M, Ormaechea E, et al. Guía para internación y manejo de pacientes con alergia al látex. Hospital Italiano [Internet]. Buenos Aires; [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/cursos_attachs/5554.pdf
13. MedlinePlus. Manejo de alergias al látex en el hogar [Internet]. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina; 2019 ago 27 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000500.htm
14. Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA). ¡Cuidado con materiales elásticos! [Internet]. Madrid; [citado 2025 ago]. Disponible en: https://www.aepnaa.org/ver/latex
15. Gil-Micharet MS, Barriga-Medina FJ, Pérez-de-Villar JA. Alergia al látex en trabajadores sanitarios. Med Segur Trab [Internet]. 2007 [citado 2025 ago]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2007000300006
16. Hernández-Sampieri R, Fernández-Collado C, Baptista-Lucio P. Metodología de la investigación. 6a ed. México DF: McGraw-Hill Interamericana; 2014.

Anexo I- Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD	Inicio	13/8/2025	20/8/2025	27/8/2025	3/9/2025	10/9/2025	17/9/2025	24/9/2025	1/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	5/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	26/11/2025
1: Presentacion de la asignatura, modalidad de cursada, y evaluacion.	13/8/2025																
2:Realizacion de registro y busqueda de bibliografia, eleccion del tema.	20/8/2025																
3: Indagacion sobre la viabilidad del tema seleccionado	27/8/2025																
4: Presentacion de la Guia para construir el TIF.	3/9/2025																
5: Introduccion: Justificacion, Planteo del problema.	10/9/2025																
6: Objetivos general y especificos	17/9/2025																
7: Presentacion del marco teorico	24/9/2025																
8: Aprobacion del marco teorico	1/10/2025																
9: Abordaje metodologico	8/10/2025																
10: Analisis de variables, operacionalizacion	15/10/2025																
11: Realizacion de instrumento de recoleccion de datos. Prueba del formulario google forms.	22/10/2025																
12: Recoleccion y analisis de la informacion	29/11/2025																
13: Realizacion de tablas y graficos	5/11/2025																
14:Analisis de resultados. Conclusion. Propuesta de mejora. Bibliografia	12/11/2025																
15: Presentacion del TF completo y power point para la defensa.	19/11/2025																
16: Entrega del Trabajo Final en UAI Ultra	26/11/2025																

Anexo II- Instrumento de recolección de datos

1. Sexo

☐ Femenino

☐ Masculino

2. Edad

☐ 21 a 30 años

☐ 31 a 40 años

☐ 41 a 50 años

☐ Mas de 51 años

3. ¿Identifica Usted los síntomas más frecuentes de la alergia al látex? (marque todas las que considere correctas)

☐ Tos

☐ Picazón

☐ Prurito

☐ Sequedad en la piel

☐ Dolor de cabeza

☐ Urticaria

☐ Anafilaxia

4. ¿Reconoce Usted cuáles son las poblaciones de mayor riesgo de ser alérgicas al látex? (marque todas las que considere correctas)

☐ Niños prematuros

☐ Espina Bífida

☐ Personal de salud

☐ Pacientes oncológicos

☐ Pacientes con múltiples cirugías

5. ¿Considera Usted probable que el personal de salud desarrolle enfermedad por látex?

☐ Probablemente desarrolle

☐ Ocasionalmente desarrolle

☐ Nunca desarrolle

6. ¿Está Usted de acuerdo en que si a la planta quirúrgica ingresa un paciente con Espina Bífida se le asigna un quirófano látex free?

☐ Totalmente de acuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

7. ¿Considera Usted que los insumos libres de látex mantienen la misma calidad funcional que los tradicionales?

☐ Son de mejor calidad

☐ Mantienen la misma calidad

☐ Son de más baja calidad

8. ¿Percibe Usted limitaciones en el acceso a insumos libres de látex?

☐ Frecuentemente percibe

☐ Ocasionalmente percibe

☐ Nunca percibe

9. Dentro de los materiales alternativos al látex ¿Usted, de cual dispone en su planta quirúrgica? (marque las que considere necesarias)

☐ Nitrilo

☐ Caucho

☐ Neopreno

☐ Poliuretano

☐ Plástico

☐ Silicona

10. ¿Conoce Usted los riesgos que produce la acumulación de látex en el organismo por estar expuesto a éste desde edades muy tempranas?

☐ Si conoce

☐ No conoce

11. En su vida cotidiana, ¿Utiliza Usted globos de manera decorativa?

☐ Siempre utilizo

☐ Frecuentemente utilizo

☐ A veces utilizo

☐ Nunca utilizo

12. ¿Considera Usted que los elementos que nos rodean que contienen látex son nocivos para nuestra salud?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero

13. La utilización de chupetes de látex en bebes afecta a la acumulación de este material en el cuerpo

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

14. ¿Considera Usted que los alimentos con reactividad cruzada (ej. banana, kiwi, palta) representan un riesgo adicional?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero

15. ¿Está Usted de acuerdo en que los casos de pacientes con alergia al látex declarada solo pueden tratarse en quirófanos que hayan sido ventilados por 4 hs.

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Totalmente en desacuerdo

16. ¿Con que frecuencia se reportan eventos adversos relacionados con látex en su planta quirúrgica?

☐ Frecuentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Nunca

17. ¿Existe en su servicio alguna identificación de quirófanos “libres de látex”?

☐ Siempre

☐ Nunca

18. En la planta quirúrgica, ¿hay disponibilidad permanente de insumos libres de látex?

☐ siempre hay disponibilidad

☐ ocasionalmente hay disponibilidad

☐ nunca hay disponibilidad

19. ¿Considera Usted que el costo de los insumos libres de látex representa una dificultad para su implementación?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero.

20. ¿Alguna vez se detectó una reacción adversa por látex en el personal de la planta quirúrgica?

☐ Se detectaron muchos casos

☐ Se detectaron unos pocos casos

☐ Nunca se detecto

21. ¿Considera Usted que los quirófanos libres de látex mejorarían la seguridad del paciente?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero

22. ¿Cree Usted que quirófanos libres de látex reducen riesgos ocupacionales en el equipo de salud?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero

23. ¿Considera Usted importante la transformación de toda la planta quirúrgica a "látex free"?

☐ Lo considero muy importante

☐ Lo considero poco importante

☐ Lo considero sin importancia

24. ¿Considera Usted que la transición hacia quirófanos totalmente libres de látex es percibida como viable en su institución?

☐ Siempre lo considero

☐ A veces lo considero

☐ Nunca lo considero

25. ¿Cree Usted que la ausencia de insumos libres de látex podría generar un evento adverso grave?

☐ Si lo creo

☐ No lo creo

26. ¿Está Usted de acuerdo en que la implementación de políticas públicas facilitaría la transición a quirófanos libres de látex?

☐ Totalmente de acuerdo

☐ De acuerdo

☐ En desacuerdo

Anexo III- Matriz de Datos

Anexo IV- Propuesta de mejora

SCAN ME

MariaEugenia.RissoPatron@alumnos.uai.edu.ar
María Eugenia Risso Patrón